

Medikamentöse Behandlung von Suchtkranken

Therapieziel

- Entzugsbehandlung
- Substitutionsbehandlung
- Nachbehandlung

Substanzgruppen

- Opiate
- Antikonvulsiva
- Antidepressiva
- Neuroleptika
- Tranquilizer
- Anticraving
- Andere

Opiate

- Methadon
- Buprenorphin
- Morphine ret.
- Codeinpräparate

Methadon

- Am längsten verwendet (1965)
- Meisten Beobachtungsstudien
- Wirkungsdauer > 24 h = 1x ige Einnahme
- sichere Verabreichung
- Geringe Akzeptanz
- Nebenwirkungen: Obstipation, Gewichtszunahme, Libidoverlust, Schwitzen, Schwindel, Depressionen

Buprenorphin

- Kaum sedierend
- Lange Wirkdauer > 48 h
- Gute Verträglichkeit
- Partieller Antagonist
„cave Umstellung“
- Sichere Einnahme
- Nebenwirkungen:
Kopfschmerzen, Obstipation,
Schlafstörung, Übelkeit,
Schwitzen
- Partieller Antagonist
- Begrenztes
Wirkmaximum
- Geringe Euphorisierung
- Bei Überdosierung
schwer zu antagonisieren
- Preis

Morphine ret.

Morphinsulfat-pentahydrat-bzw-hydrochlorid

- Gute Verträglichkeit
- Zulassung zur Substitution
- Wirkdauer > 24 h
- Hohe Akzeptanz
- Unsichere Einnahme
- Hoher Marktwert
- Im HT nicht von Heroin zu unterscheiden
- Handel Weitergabe
- Preis

Codein

- Überbrückungsmedikament
- Entzugsmöglichkeit

Mittlere Einstellung Umrechnung

Methadon	Morphin	Bupren.	Codein
60-80 mg	600-800mg	8-16 mg	
10 mg	100 mg	2 mg	120 mg

Dosierung bei Ersteinstellung

- Methadon 10-40 mg
- Morphinum 100-320mg
- Buprenorphin 2-24 mg
- Codein 120-360 mg

Dosierungen

Substanz	Max 1.Tag	Niedrig	mittel	hoch
Methadon	40 mg	<60mg	70-90mg	100-120mg
Morphin	320 mg	<300mg	400-600mg	700-1000mg
Buprenor.	8-24 mg	<6mg	8-16mg	18-32mg
Codein	360	<360mg	480-840	960-1200mg

Umrechnung

Methadon	Morphium	Methadon	Buprenorphin
40mg	200mg	30mg	8mg
60mg	400mg	50mg	12mg
80mg	600mg	65mg	16mg
100mg	800mg	80mg	20mg

Buprenorphin & Naloxon

- Wirkungslosigkeit bei iv Konsum
- Geringes Missbrauchsrisiko
- Kontraindiziert bei Schwangerschaft
- Zulassung bis 24 mg tgl (Subutex 32 mg)